




SEDATIF PC[®]

TABLETTEN



Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Dit homeopatisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om SEDATIF PC zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te raadplegen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Sédatif PC en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Sédatif PC inneemt.
3. Hoe wordt Sédatif PC ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Sédatif PC tabletten?

Sédatif PC, tabletten

De actieve bestanddelen zijn Aconitum napellus 6 CH, Belladonna 6 CH, Calendula officinalis 6 CH, Chelidonium majus 6 CH, Abrus precatorius 6 CH, Viburnum opulus 6 CH.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn sucrose, lactose, magnesium stearaat.


Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Frankrijk.

Voor inlichtingen en informatie:

KERNPHARM B.V.
Postbus 26 - 5460 AA Veghel
0800-0997773 (gratis).

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 81811.



1. WAT IS SEDATIF PC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Sédatif PC is een homeopatisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij nervositeit (door stress) en slapeloosheid. De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het college ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.

De tabletten zijn verpakt in doosjes met 2 doordrukstrips van 20 tabletten.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SÉDATIF PC INNEEMT

Wanneer mag u SÉDATIF PC niet gebruiken ?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Sédatif PC niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met SÉDATIF PC ?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Sédatif PC moet zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend beïnvloedt dit geneesmiddel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

Gebruik van Sédatif PC in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker indien u momenteel medicijnen slikt of recentelijk enig ander medicijn heeft geslikt, ook indien niet voorgeschreven.

3. HOE WORDT SÉDATIF PC INGENOMEN ?

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 2 tabletten 3 maal per dag.

De tabletten langzaam in de mond laten oplossen.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, of wanneer de klachten terugkeren raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel van SÉDATIF PC heeft ingenomen
Wanneer u teveel Sédatif PC heeft ingenomen zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent SÉDATIF PC in te nemen
Er zijn geen bijwerkingen te verwachten wanneer u bent vergeten Sédatif PC in te nemen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met SÉDATIF PC wordt beëindigd
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Er zijn van dit geneesmiddel geen bijwerkingen bekend. Indien er bij u toch een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SÉDATIF PC ?

Sédatif PC buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25°C in de goed gesloten, originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Sédatif PC niet meer na de datum op de verpakking achter: “niet te gebruiken na”.

Deze bijsluiters is voor het laatst goedgekeurd in april 2002.